

Diffusion de la méthode médicamenteuse pour l'interruption de grossesse dans le canton de Vaud : 2006-2011


Locicero S., Boubaker K., Spencer B.

Lausanne, le 30 août 2012

Méthodes d'interruption de grossesse – Régime du délai (CH)

- Méthode médicamenteuse
 - → 7 semaines suivant le début des dernières règles (voire → 9 semaines)
 - Pilule abortive : Mifégyne (RU 486) + Cytotec
- Méthode chirurgicale
 - → 12 semaines suivant le début des dernières règles
 - Aspiration intra utérine ou curetage


Historique du monitoring



La méthode


- **Formulaire de déclaration obligatoire pour Vaud:**
 - Caractéristiques sociodémographiques
 - Caractéristiques de l'intervention (âge gestationnel, établissement, motif principal, méthode d'intervention)
- **Analyses de tendance :**
 - 2006 à 2011
 - Test non paramétrique 'nptrend'(Stata)
- **Régression logistique :**
 - facteurs associés à l'utilisation de la méthode médicamenteuse

Méthodes d'intervention : tendances 2006-2011



$p=0.000$, tendances significatives

Utilisation de la méthode médicamenteuse par lieu d'intervention



Caractéristiques de la clientèle

- Différentes selon les lieux d'intervention
 - Ex. : % femmes étrangères > CHUV
- Inchangées au sein d'une même institution entre 2006 et 2011
 - Ex. : Age moyen des femmes, % en couple, % ayant un emploi sont stables

L'inégalité de diffusion de la méthode médicamenteuse ne s'explique pas par les caractéristiques de la clientèle.

Caractéristiques de l'IG par lieu d'intervention, données 2011 (en %)

	CHUV	Hôpitaux régionaux	Cliniques privées	Cabinets privés
Age gestationnel ≤12 sem.	92.4	94.9	98.9	100
Motif IG				
Psycho-social	96.9	90.4	94.6	97.0
Somatique	2.8	8.4	5.4	3.0
Psychiatrique	0.0	0.9	0.0	0.0
Viol-inceste	0.3	0.3	0.0	0.0

L'inégalité de diffusion de la méthode médicamenteuse ne s'explique pas par les caractéristiques de l'IG.

Facteurs associés à la méthode médicamenteuse

Variable dépendante : Méthode médicamenteuse	Odds ratio	P-value
Age (≥ 27 ans)	1.10	0.112
Nationalité étrangère	0.96	0.694
Motif de l'IG		
Viol	1.96	0.220
Psychiatrique	0.34	0.283
Psycho-social	2.48	0.000
Age gestationnel ≤ 7 semaines	30.54	0.000
Lieu de l'intervention		
Hôpital	1.38	0.000
Clinique	0.29	0.000
Cabinet	74.08	0.000
Année de l'intervention		
2007	1.12	0.263
2008	1.24	0.034
2009	2.34	0.000
2010	4.45	0.000
2011	8.25	0.000

Conclusions

- Logique institutionnelle à l'origine de la diffusion de la méthode médicamenteuse.
- Néanmoins, les déterminants des différences observées :
 - ne peuvent pas être identifiés dans le cadre d'un monitoring ;
 - nécessiteraient une investigation particulière.

Merci pour votre attention

Rapports disponibles sous :
www.iumsp.ch (Publications / Raisons de santé)
ou stephanie.lociciro@chuv.ch